PHÂN TÍCH CỘNG ĐỒNG VI KHUẨN TRONG PHÂN Ủ BẰNG KỸ THUẬT DGGE

Ngô Đức Duy^{1*}, Đào Thị Thu Hiền¹, Hoàng Quốc Khánh¹, Nguyễn Thị Tường Vi²

⁽¹⁾Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (*ngoduy007@yahoo.com

⁽²⁾Trường đại học Kỹ thuật công nghệ tp Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật điện di DGGE nhằm phân tích sự tồn tại của cộng đồng vi sinh vật trong phân ủ. Từ 10 mẫu phân ủ đã ly trích, tách chiết và thu nhận bộ gen, nhân bản đoạn 16S rDNA trên cặp mồi 27F và 907R. Và sau đó chọn mẫu số 6 cho việc phân tích DGGE trên vùng V3 với cặp mồi 517F-GC và 357R, 517F và 357R, kết quả có 9 trình tự gen thuộc vùng V3 như sau: 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6d1, 6d2, 6d3, 6e1 và 6e2. Phân tích và so sánh sự tương đồng với các dữ liệu trên Ngân hàng Gen theo Accession number như sau: 6a1, 6a2 tương đồng 99% với JF987387.1 và JF828759.1, JF 989848.1 tương đồng 93% với 6a4 và 88% 6a3, 6d1 tương đồng 82% với AB206012.1, 6d2 tương đồng 95% với JF429206.1, 6d3 tương đồng 86% với FN781411.1, 6e1 tương đồng 99% với JF176784.1 và FJ516783.1 tương đồng 87% với 6e2.

Từ khóa: Cây phát sinh loài, DGGE, PCR, vùng V3 và 16S rDNA

MỞ ĐẦU

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) là kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản, được công bố lần đầu tiên bởi Fischer và Lerman [3], phương pháp này dựa trên sự thay đổi và biến đổi về nucleotide trong cấu trúc mạch DNA. Phương pháp DGGE đã ứng dụng nhiều trong việc xác định sự thay đổi hệ vi sinh vật trong môi trường thích ứng với các điều kiện sinh thái khác nhau. Do vậy, ưu điểm của phương pháp này có thể kiểm chứng và đánh giá sự hiện diện và quá trình thay đổi hệ vi sinh vật tồn tại trong mẫu vật và môi trường cần khảo sát.

Hiện nay rất nhiều công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp DGGE, X. Lai (2006) đã sử dụng phương pháp DGGE phân tích thành phần vi sinh vật trong trầm tích biển sâu của vùng biển phía Nam Trung Quốc [16]. S. Salet (2007) đã khảo sát sự đa dạng hệ vi sinh vật trong biểu mô dạ cỏ [11]. Muyzer (1999) đã sử dụng phương pháp DGGE/TGGE xác định các gene vi sinh vật từ hệ sinh thái tự nhiên [7]. Knapp đã sử dụng phương pháp DGGE xác định phức hợp chính đa hình tính tương hợp mô trong tế bào thực vật. Okada phân tích cộng đồng tuyến trùng từ đất bằng DGGE [8]. Jun Wang và cs thì phân tích cộng đồng vi sinh vật trong hồ chứa dầu nhiệt độ cao [5]. Watanabe dùng DGGE phân tích đoạn 16S rDNA cộng đồng vi sinh vật cổ sinh khí methan từ đất ruộng [14]. Điều này

chứng minh sự đa dạng của việc ứng dụng phương pháp DGGE trong nghiên cứu.

Các nghiên cứu được công bố trong nước về việc ứng dụng sinh học phân tử trong lĩnh vực xác định loài sau khi đã phân lập, tách chiết, thu nhận và định danh vi sinh vật đã được thuần chủng. Và bên cạnh đó các sản phẩm phân bón từ phân ủ không xác định thành phần chính yếu vi sinh vật có lợi và gây hại ban đầu, mà chủ yếu là thêm các chủng loại vi sinh vật vào làm phân bón; phân vi sinh cố định đạm (*Rhizobium* sp., *Bradyrhizobium* sp.), phân vi sinh kháng nấm (*Trichoderma* sp.)... Do vậy, nghiên cứu này bước đầu ứng dụng phương pháp DGGE nghiên cứu trực tiếp cộng đồng vi sinh vật trong phân ủ.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu

Đối tượng: 10 mẫu phân chuồng thu nhận tại xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hóa chất sử dụng trong ly trích DNA: Lysis buffer (100 mM Tris_HCl pH = 8; 100 mM EDTA pH = 8; 100 mM Sodium Phosphate pH = 8; 1,5 M NaCl và 1% CTAB), proteinase K (10 mg/ml), SDS 10%, chloroform/isoamyl alcohol (24:1 v/v), isopropanol, ethanol 77% và 99,5%...

Hóa chất dùng tinh sạch DNA: TAE

(Tris-acetate-EDTA), TBE (Tris-borate-EDTA), agarose, ethidium bromide (EtBr), PEG 8.000, chloroform/isoamyl alcohol (24:1v/v), glycogen (10 mg/ml), 3 M sodium acetate, 2,5 M ammonium acetate, ethanol 70% và 99,5%, TE buffer...

Hóa chất dùng trong phản ứng PCR: H₂O, dNTPs, PCR buffer 10X, Mg²⁺, Taq polymerase, các cặp mồi được sử dụng trong PCR và DGGE: 27F và 907R, 357F -GC và 517R, 357F và 517R.

Hóa chất dùng trong phương pháp DGGE: Polyacrylamide, Bis-polyacrylamide, SYBR Green, Gel Temed, PSA, Urea, Fomamide, TAE....

Phương pháp

Quy trình ly trích genomic DNA

Quy trình tách chiết DNA tổng số được thực hiện theo phương pháp SDS (Sodium dodecyl sulfate method) [4].

Quy trình tinh sạch và thu nhận genomse DNA

Quy trình tinh sạch genomic DNA bằng phương pháp Troughing.

Nhân bản đoạn gene 16S rDNA của nhóm vi khuẩn

Phản ứng khuếch đại đoạn gene 16S rDNA được thực hiện với 2 cặp mồi chuyên biệt cho nhóm vi khuẩn gồm 27F và 907R. Chu kỳ phản ứng PCR như sau: 95°C/10p, 93°C/1p, 50°C/1p, 72°C/2p, (95°C/30p, 50°C/30g, 72°C/2p) lặp lại 30 chu kỳ, 95°C/1p, 50°C/1p, 72°C/5p.

Phân tách các trình tự gene của mỗi vi khuẩn bằng phương pháp DGGE

Đoạn gene 16S rDNA có kích thước khoảng 1.600bp. Trên đoạn gene này tiến hành khuếch đại vùng V₃ để phân tích DGGE (kích thước đoạn V₃ khoảng 200 bp). Phản ứng PCR đoạn V₃ của DGGE được thực hiện với hai cặp mồi chuyên biệt cho nhóm vi khuẩn là 357F-GC và 517R.

Chu kỳ phản ứng PCR vùng V₃ thuộc đoạn gene 16S rDNA của DGGE: 95°C/10p, (93°C/30g, 65°C/40g, 72°C/1p) lặp lại 9 chu kỳ,

(93°C/30g, 60°C/40g, 72°C/1p) lặp lại 9 chu kỳ, (93°C/30g, 55°C/40g, 72°C/1p) lặp lại 8 chu kỳ, 93°C/30g, 55°C/40g, 72°C/5p.

Thu nhận và tinh sạch genomic DNA

Quy trình tinh sạch sau khi cắt band DNA trên gel polyacrylamide, thêm 300 l ethanol 99,9%. Ly tâm 13.000 rpm/phút, loại bỏ ethanol, thêm 200 l DEB.

Sử dụng bộ KIT QIAEX II để tiếp tục tinh sạch và thu nhận DNA từ gel acrylamide.

Các phần mềm phân tích dữ liệu trình tự đoạn gene và thiết lập cây phát sinh loài là phần mềm EditSeq, MegAlign và ChromasPro; <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> và <http://www.ebi.ac.uk/Tools>.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Phân ủ là một quá trình phân hủy hiếu khí, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy thông qua các hoạt động của các nhóm vi sinh vật. Sự tồn tại các nhóm vi sinh vật theo từng giai đoạn và phụ thuộc vào nguồn carbon hữu cơ hòa tan, tỷ lệ thay đổi C/N [2], cũng như nhiệt độ và pH trong các giai đoạn phân hủy trong báo cáo của Cahyani (2003) [1] cho thấy cộng đồng vi khuẩn trong phân bón của rơm rạ như *Alphaproteobacteria* trong nguyên liệu, *Bacillus* và *Actinomycetes* ở giai đoạn ưa nhiệt và *Cytophaga* và *Clostridial*. Theo kết quả nghiên cứu của Steger (2007) [13] cho thấy thay đổi thành phần trong cộng đồng *Actinobacteria* trong quá trình ủ thải hữu cơ theo quy mô của hộ gia đình. Trong thí nghiệm này, chúng tôi chọn phân chuồng ủ từ các hộ gia đình theo phương thức truyền thống, nên quá trình tách chiết và tinh sạch cũng như nhân bản đoạn gene 16S rDNA cho kết quả thường không ổn định xem hình 1.

Kết quả ở hình 1 ghi nhận được việc tác chiết và thu nhận bộ gene DNA của vi sinh vật trực tiếp từ các mẫu khác nhau trong điều kiện không đồng nhất và lặp lại theo phương pháp SDS so sánh cùng các kết quả nghiên cứu trong [17, 15, 10] và với kết quả này cho phép chúng tôi tiếp tục tinh sạch genomic DNA.

Hình 1. Kết quả DNA sau khi tách chiết và thu nhận trên gel agarose 0,8%

Các giếng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 là kết quả DNA được tách chiết theo phương pháp SDS từ các mẫu phân chuồng ủ khác nhau; các giếng từ 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9' và 10' là các mẫu lặp lại trên.

Hình 2. Kết quả DNA sau tinh sạch bằng phương pháp Troughing trên gel agarose 0,8%.

Các giếng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 là kết quả DNA được tách chiết theo phương pháp SDS từ các mẫu phân chuồng ủ khác nhau; các giếng từ 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9' và 10' là các mẫu phân lặp lại trên.

Hình 3. Kết quả nhân bản đoạn 16S rDNA và vùng V3 của nhóm vi khuẩn.

A, B. Kết quả nhân bản đoạn 16S rDNA của nhóm vi khuẩn trên gel agarose 0,8%;
C. Kết quả nhân bản vùng V3 thuộc đoạn 16S rDNA của nhóm vi khuẩn trên gel agarose 2%.

Sau khi tinh sạch DNA bằng phương pháp Trounching và kiểm tra trên gel agarose 0,8% ở hình 2 của 10 mẫu phân tử từ những điều kiện không đồng nhất và so sánh với các kết quả của [9, 6, 12] kết quả tinh sạch này chúng tôi chọn 10 mẫu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10) tiếp tục nhân bản đoạn gene 16S rDNA của nhóm vi khuẩn dựa trên 2 cặp mồi 27F và 907R từ bộ gene DNA hỗn hợp trên.

Vì trong quá trình lý trích DNA của mẫu thì có thể DNA của toàn bộ vi sinh vật như là nấm

men, xạ khuẩn, nấm mốc và cả vi khuẩn đều được thu nhận. Do vậy, kết quả nhân bản đoạn gene 16S rDNA cũng chưa thật sự ổn định. Hình 3A và B cho kết quả nhân bản trình tự đoạn 16S rDNA, hình 3C cho kết quả vùng V3 thuộc đoạn 16S rDNA có kích thước khoảng 200bp. Tuy nhiên, kết quả này không cho chúng ta biết được gì về các đoạn gene chuyên biệt của từng loài vi khuẩn trong cùng một mẫu. Do vậy, tiếp tục sử dụng phương pháp DGGE nhằm tách ra riêng rẽ các trình tự của mỗi loài vi khuẩn khác nhau trong cùng một mẫu (mẫu số 6).

Hình 4. Các trình tự vùng V3 của vi khuẩn mẫu số 6
điện di trên gel acrylamide biến tính trong 60°C, 300 phút và gel agarose 2%

A. Kết quả mẫu số 6 được điện di trên gel acrylamide biến tính trong 300 phút lần 1; B. Kết quả mẫu số 6 được điện di trên gel acrylamide biến tính trong 300 phút lần 2; C. Kết quả mẫu số 6 được điện di trên gel acrylamide biến tính trong 300 phút lần 3; D. Kết quả mẫu số 6 đã PCR cho các đoạn gene khác chủng vi khuẩn trên gel agarose 2%.

Phân tách liên tục các phân đoạn từ hình 4A cho đến 5B và 5C cho kết quả cuối cùng khi đã tách riêng từng đoạn gene của các chủng vi khuẩn trong cùng một mẫu thí nghiệm 6 cho ra 6a, 6b, 6c, 6d và 6e theo hình 4A, tiếp tục DGGE cho tới khi phân tách hoàn toàn cho ra được 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6d1, 6d2, 6d3, 6e1 và 6e2, bên cạnh đó thì các kết quả phân tách phân đoạn 6b, 6c không cho kết quả. Nhưng vậy chỉ trong 1 mẫu thí nghiệm 6 cho chúng ta 9 phân

đoạn vùng V3 khác nhau trên hệ thống DGGE BioRad, điều này có khả năng 9 phân đoạn gene này thuộc 9 chủng loài vi khuẩn khác nhau trong cùng một mẫu.

Tiếp tục xác định sự 9 phân đoạn này, chúng tôi thực hiện nhân bản (PCR) cho kết quả trong hình 4D và giải mã các trình tự cho ra kết quả như sau; 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6d1, 6d2, 6d3, 6e1 và 6e2.

>6a1:TCGGAATTTTGCCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCAACGCCGCGTGAAGGATGAAGTATTTTCGGT
ATGTAAACTTCgAAAGAATGGGAAGAATAAATGACGGTACCATTATAAGGTCCGGCTAACTACGTG

>6a2:TCGGGAATTTTGGCCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCAACCCCGCGTGAAGGATGAAGTATTTTCGTC
ATCCTTCACGCGCTTGATGGGAAGAAAAATGACGGTACCATTTATAAGCTCCGGCTAACTACGTG

>6a3:TCGGGAATTTTGGCCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCAACCCCGCGTGAAGGATGAAGTATcCTCGG
GATGTGTAACCTCCTAAGAATGGGAAGAATAAATGACGGTACCATTTATAAGCTCCGGCTAACTACGTG

>6a4:TCGGGAATTTTGGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCAACGCCGCGTGAAGGATGAAGTATTTTCGGT
ATGTAAACTTCGAAAGAATGGGAAGAATAAATGACGGTACCATTTATAAGCTCCGGCTAACTACGTG

>6d1:TAGGGAATATTGCCCAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAACCCCGTGTGAGGAGAAGGCCTTAAGGTT
TGTCAGCGTAAACCTCTTTTTCAGGGATGATAATGACTGTACCTGCAGAGGAAGCTCCGGCTAACTCCGTG

>6d2:TAGGGAATATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAACGCCGCGTGTAGTATGAAGGCCTTCGG
ATTGTAAACCTCTTTTACCAGGGATGATAATGACTGTACCTG-GAGAAGAAGCTCCGGCTAACTCCGTG

>6d3:GGGGAATTTTTTGCATGGGGGAAACCTGATGGAGCaTGCCGCGTGAAGGAAGAAGGCCTTCGGG
TCGTGACTTCTTTCTCGGAGAAGAACTATGACGGTCTCTGAAGAAAAGCCGGCTATATCTCTGTCCCGG
CCCCCGCGGATATAA

>6e1:GGGGAATATTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGAGTATGAAGGCCTTAGG
GTTGTAAAGCTCTTTTACCCGGGATGATAATGACCGTACCCGGAGAATAAGCTCCGGCTAACTCCGTG

>6e2:TAGGAAATTTTCTCCAAGGGGGCAAACCCGAAGCCAGCAATCCGGCGGGAGTGAGAAAGCCTTCGGG
TCGTAAAGCTCTTTTCTGTGTGACGAGGAAGGCCGGTCCCGCAGGAATAACTCCGGCTACCTCTGGCCAC
CGCCCCCGGTATTAA

Từ những kết quả giải trình tự đoạn gene vùng V3 và so sánh các đoạn gene tương đồng trong ngân hàng dữ liệu gene tại website <http://www.ncbi.nlm.gov/BLAST> và

<http://www.ebi.ac.uk/Tools>. Xây dựng cây phát sinh loài với các phần mềm EditSeq, MegAlign, ChromasPro, cho kết quả cây phát sinh loài theo hình 5.

Hình 5. Cây phát sinh loài (phylogenetic tree) từ các trình tự vùng V3 của 9 trình tự gene khác nhau

Vùng V3 có chiều dài gene trong khoảng 200 bp, do vậy cấp độ tương đồng trong vùng này sẽ cho kết quả phân loại loài chưa hoàn thiện hơn đoạn 16S rDNA của nhóm vi khuẩn. Tuy nhiên việc tách riêng từ phân đoạn của từng chủng riêng biệt trong cùng một mẫu DNA cho phép so sánh trên hệ thống ngân hàng dữ liệu gene và cây phát sinh loài hình 5 đều liên qua tới các chủng vi khuẩn (*Uncultured bacteria*) chưa được định danh hoàn toàn.

KẾT LUẬN

Phân tích mẫu số 6 trong 10 mẫu ly trích và thu nhận DNA của vi sinh vật từ mẫu phân ủ tại xã Hòa Tân Đông bằng phương pháp DGGE chúng tôi thu nhận được kết quả sau 3 lần DGGE có 9 phân đoạn gene là 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6d1, 6d2, 6d3, 6e1 và 6e2, nhưng bên cạnh đó các phân đoạn 6b, 6c không cho kết quả. Sau khi giải mã trình tự và thiết lập cây phát sinh loài theo Bootstrap Trials = 1.000 cho kết quả cuối cùng trên hình 5 đa số cho ra các Accession number như sau: 6a1, 6a2 tương đồng 99% với JF987387.1 và JF828759.1, JF989848.1 tương đồng 93% với 6a4 và 88% 6a3, 6d1 tương đồng 82% với AB206012.1, 6d2 tương đồng 95% với JF429206.1, 6d3 tương đồng 86% với FN781411.1, 6e1 tương đồng 99% với JF176784.1 và FJ516783.1 tương đồng 87% với 6e2 từ GenBank NCBI.

Lời cảm ơn: Có được những kết quả nghiên cứu này, chúng tôi được sự hỗ trợ từ Giáo sư Yasuo Igarashi và Tiến sĩ Mannix Pedro, trường đại học Tokyo, Nhật Bản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cahyani V. R., Matsuya K., Asakawa S., Kimura M., 2003. Succession and phylogenetic composition of bacterial communities responsible for the composting process of rice straw estimated by PCR-DGGE analysis. *Soil. Sci. Plant Nutr.*, 49: 619-630.
2. Chefetz B., Hatcher P. G., Hadar Y., Chen Y., 1996. Chemical and biological characterization of organic matter during composting of municipal solid waste. *J. Environ. Qual.*, 25: 776-785.
3. Fircher S., Lerman L., 1983. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 80, 1519-1583.
4. Jia Xia, Han Shi-Jie, ZHAO Yong-hua, ZHOU-Yu-mei, 2006. Comparisons of extraction and purification methods of soil microorganism DNA from rhizosphere soil, *Journal of Forestry research*, 17(1): 31-34.
5. Jun Wang, Ting Ma, Lingxia Zhao, Jinghua Li, Lingxia Zhao, Guoqiang Li, 2008. PCR-DGGE method for analyzing the bacterial community in a high temperature petroleum reservoir, *World J. Microbial. Biotechnol.*, 21: 1981- 1987.
6. Michael Danon, Ingrid H. Franke-Whittle, Heribert Insam, Yona Chen, Yitzhak Hadar, 2008. Molecular analysis of bacterial community succession during prolonged compost curing. *FEMS Microbiology Ecology*, 65: 133-144
7. Muyzer, 1999. DGGE/TGGE a method for identifying genes from natural ecosystems. *2(3): 317-322.*
8. Okada H, 2010. Technical report on the PCR-DGGE analysis of soil Nematode community, Ver.2.3, Revised on June 14.
9. P. Harnpicharuchai, T. Thongaram, R. Sriprang, R. Champreda, S. Tanapongpipat, L. Eurwilaichitr, 2007. An efficient purification and fractionation of genomic DNA from soil by modified trounging method, *Letters in Applied Microbiology* ISSN 0266-8265.
10. Rickwood D., Hames B. D., 1984. *Gel Electrophoresis of Nucleic Acids.*, IRL Press Ltd. Oxford, UK.
11. S. Salet, C. Martin, B. Meunier, D. P. Morgavi, 2007. PCR- DGGE analysis reveals a distinct directy in the bacterial population ataached to the rumen epithelium. *Aninal.*, 1(7): 939-945.
12. Sasaki H., Nonaka J., Otawa K., Kitazume O., Asano R., Sasaki T., Nakai Y., 2009: Analysis of the structure of the bacterial community in the livestock manure-based composting process.
13. Steger K., Sjögren Å. M., Jarvis Å., Jansson

- J. K., Sundh I., 2007. Development of compost maturity and *Actinobacteria* populations during full-scale composting of organic household waste. *J. Appl. Microbiol.*, 103: 487-498.
14. Takeshi Watanabe, Susumu Asakawa, Asumi Nakamura, Kazunari Nagaoka, Makoto Kimura, 2004. DGGE method for analyzing 16S rDNA of methanogenic archaeal community in paddy field soil, *FEMS Microbiology letters*, 232: 15-163.
 15. Tomoyukihori, Shin Harura, Yohiyuki Ueno, MasaharuIshii, Yasuo Igarashi, 2006. Direct comparinon of singlestand conformation polymorphism (SSCP) and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) to characterize a microbial community on the basis of 16S RNA gene fragments, *Journal of Microbiological Methods* Vol 6: 6165–169.
 16. Xintian Lai, Xiaofan Zeng, Shu Fang, Yali Huang, Lixiang Cao, Shining Zhou, 2006. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis of bacterial community composition in deep-sea sediments of the South China Sea. *World J. Microbioal. Biotechnol.*, 22: 1357-1345.
 17. Z. H. Yang-Y, Xiao-G. M. Zeng-Zh. X, Yu-Y. Sh. Liu, 2007. Comparisions of methods for total community DNA extraction and purification from compost. *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, 74: 918-925.

BACTERIA COMMUNITY ANALYSIS OF COMPOST BY DENATURING GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS (DGGE) METHOD

Ngo Duc Duy¹, Dao Thi Thu Hien¹, Hoang Quoc Khanh¹, Nguyen Thi Tuong Vi²

⁽¹⁾Institute of Tropical Biology, VAST

⁽²⁾Ho Chi Minh city University of Technology

SUMMARY

In this study, we used DGGE technique to analyze the existence of microbial community of compost. From ten samples extracted, isolated genomic and amplify 16SrDNA region by 27F and 907R primer. And then choice No.6 for analysis by DGGE method with primers (517F-GC, 357R and 517F, 357R) had result nine sequences of V3 region follow as: 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6d1, 6d2, 6d3, 6e1 and 6e2. The analysis and compared with is database onto GeneBank for sequence similarities follow with Accession number: 6a1, 6a2 similarities 99% with JF987387.1 and JF828759.1, JF 989848.1 similarities 93% with 6a4 and 88% 6a3, 6d1 similarities 82% with AB206012.1, 6d2 similarities 95% JF429206.1, 6d3 similarities 86% with FN781411.1, 6e1 similarities with 99%JF176784.1 and FJ516783.1 similarities 87% with 6e2.

Keywords: DGGE, PCR, phylogenetic tree, V3 region, 16S rDNA

Ngày nhận bài: 21-6-2012