TÁCH DÒNG GEN SHRUNKEN 2 (*Sh2*) TỪ DÒNG NGÔ H14 VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN *pCAMBIA 1301-Ubi-Sh2*

Nguyễn Thị Thu, Lê Hoàng Đức, Nguyễn Đức Thành*

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, *nguyenducthanh_pcg@ibt.ac.vn

TÓM TẮT: Gen Shrunken 2 (*Sh2*) đã được chứng minh là gen mã hóa cho tiểu phần lớn của enzyme ADP-glucose pyrophosphorylase nội nhũ, một enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp tinh bột ở nội nhũ. Đoạn gen này đã được nghiên cứu chuyển thành công vào cây ngô làm tăng hàm lượng tinh bột lên đáng kể so với cây đối chứng không chuyển gen. Với mục tiêu tạo các dòng ngô có năng suất, chất lượng cao, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, tách dòng gen *Sh2* và thiết kế vector phục vụ việc chuyển gen *Sh2* vào một số dòng ngô trồng ở Việt Nam. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một số kết quả thu được về tách dòng gen *Sh2* bằng PCR từ dòng ngô H14 và xây dựng vector chuyển gen mang gen *Sh2*. Trình tự gen *Sh2* tách dòng được từ dòng ngô H14 có độ tương đồng cao (99%) so với gen *Sh2* đã công bố trên Ngân hàng Gen quốc tế (GenBank) có mã số NM_001127632.1. Gen *Sh2* từ dòng ngô H14 sau đó được gắn thành công vào vector biểu hiện *pCambia1301* cùng với promoter Ubiquitin (*Ubi*) để thiết kế vector chuyển gen mang gen *Sh2*: *pCambia 1301-Ubi-Sh2* phục vụ cho chuyển gen.

Từ khóa: ADP-glucose pyrophosphorylase, dòng ngô H14, gen Shrunken 2, tách dòng gen, vector chuyển gen.

MỞ ĐẦU

Việc tăng năng suất cây trồng đặc biệt là các cây lương thực như ngô, lúa, lúa mì v.v. đang là thách thức đối với các nhà chọn tạo giống cây trồng. Hiện nay có hai hướng chủ yếu để tăng năng suất cây trồng, đó là cải tiến phương thức canh tác và sử dụng giống mới dựa vào nỗ lực của các nhà khoa học và chọn giống. Cho đến nay, các nhà khoa học thường nghiên cứu tạo giống mới theo các hướng như: nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen, di truyền phân tử các tính trạng quan tâm, chọn lọc nhờ chỉ thị phân tử và công nghệ gen. Cây ngô là cây trồng thu hạt nên tăng năng suất cây chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như: chiều dài bắp, số lượng hạt, khối lượng của hạt. Để ứng dụng công nghệ gen vào việc tăng năng suất cây ngô chúng ta cần nghiên cứu các quá trình liên quan đến năng suất như: quá trình quang hợp, quá trình tổng hợp tinh bột, hoạt động của các gen điều khiển quá trình tổng hợp sinh khối. Nhiều nghiên cứu hóa sinh và phân tử đã làm sáng tỏ vai trò của các enzyme trong quá trình tổng hợp tinh bột. Các nghiên cứu cho thấy, ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) là enzyme đóng vai trò chìa khóa trong quá trình điều khiển tổng hợp tinh bột ở hạt ngũ cốc [1, 2, 3, 4, 5, 7, 10]. Enzyme AGPase có cấu trúc tứ phân gồm 2 tiểu

phần nhỏ được mã hóa bởi gen *Brittle 2* (*Bt2*) và 2 tiểu phần lớn được mã hóa bởi gen Shrunken 2 (*Sh2*). Chuyển gen *Sh2* và *Bt2* là một trong những hướng nghiên cứu nhằm tăng khả năng tổng hợp tinh bột, tăng năng suất cây trồng. Hiện nay ở Trung Quốc đã có công bố về việc chuyển thành công hai gen này vào cây ngô làm tăng khối lượng hạt ngô: khối lượng 100 hạt tăng lên 15% so với các dòng không chuyển gen và hàm lượng tinh bột tăng đến 74% so với 65% ở cây không chuyển gen [6].

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu tách dòng gen *Sh2* từ dòng ngô H14 và thiết kế vector chuyển gen *pCambia 1301-Ubi-Sh2* phục vụ cho chuyển gen tăng cường tổng hợp tinh bột ở cây ngô.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu

Vật liệu để nghiên cứu tách dòng gen *Sh2* là các hạt (sau 10 ngày thụ phấn) của dòng ngô H14 do Viện Nghiên cứu ngô cung cấp. Vector *pBT* do phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Công nghệ sinh học cung cấp. Chủng vi khuẩn *E. coli* DH5α do hãng Invitrogen cung cấp. Đoạn gen *Ubi* được phân lập tại phòng Di truyền tế bào thực vật, Viện Công nghệ sinh

học và được công bố trên Genbank với mã số JX947345.1. Vector *pCambia 1301* do phòng Di truyền tế bào thực vật, Viện công nghệ sinh học cung cấp.

Cặp mồi đặc hiệu để nhân gen *Shrunken 2* (*Sh2*) được thiết kế bằng phần mềm Primer 3 [8] dựa trên trình tự gen *Sh2* đã được công bố trên Genbank với mã số NM_001127632.1 và được bổ sung thêm các vị trí cắt của enzyme giới hạn phục vụ cho nhận biết và gắn gen vào vector biểu hiện. Mồi xuôi ZmSh2F: 5'-GCGGATCCGATATGCAGTTTGCACCTTGC-3' có gắn trình tự điểm cắt của enzyme *Bam*HI. Mồi ngược ZmSh2R: 5'-GCGAGCTCCTATATGACAGACCCATCGTTG-3' có gắn trình tự điểm cắt của enzyme *Sac*I. Đoạn mồi xuôi có chiều dài là 28 nucleotide tỷ lệ GC là 53,6% và nhiệt độ nóng chảy là 64,4°C. Đoạn mồi ngược có chiều dài là 30 nucleotide, tỷ lệ GC là 53,3% và nhiệt độ nóng chảy của mồi là 64,1°C. Cặp mồi sẽ nhân được đoạn gen có chiều dài lý thuyết là 1,5 kb tương đương với chiều dài của đoạn gen *Sh2*.

Phương pháp

RNA tổng số được tách từ hạt ngô dòng H14 bằng phương pháp sử dụng Trizol. Sản phẩm tách được điện di kiểm tra trên gel agarose 1% trong đệm là TBE 1X. Tổng hợp cDNA từ RNA tổng số sử dụng kit RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (Fermentas). Nhân gen từ cDNA bằng kỹ thuật PCR. Thành phần phản ứng bao gồm dNTPs 1 mM: 4 µl, H₂O: 9,7 µl, buffer PCR 10X: 2 µl, cDNA (50 ng/µl): 1 µl, Taq DNA 5 u/µl: 0,1 µl, mồi ZmSh2F 50 ng/µl: 1 µl, ZmSh2R 50 ng/µl: 1 µl, MgCl₂ 25 mM: 1,2 µl. Chu trình chạy PCR nhân gen được thiết kế: 94°C: 4 phút; 58°C: 1 phút; 72°C: 2 phút. Đoạn DNA nhân gen được tinh sạch bằng kit AccuPrep® Gel Purification (Bioneer). Đoạn gen sau đó được gắn vào vector *pBT* tạo plasmid tái tổ hợp sử dụng T4 DNA ligase. Biến nạp plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn *E. Coli* DH5α bằng phương pháp sốc nhiệt. Các dòng khuẩn được chọn lọc bằng PCR clony sử dụng cặp mồi đặc hiệu nhân *Sh2*. Các vi khuẩn sau khi chọn lọc có chứa các đoạn gen mục tiêu được nuôi trong môi trường LB lỏng có bổ sung kháng sinh ampicillin 100 mg/ml và tách

plasmid tái tổ hợp bằng phương pháp mô tả trong Sambrook et al. (1989) [9]. Plasmid được cắt kiểm tra bởi enzyme cắt giới hạn *Bam*HI và *Sac*I (theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Trình tự gen *Sh2* từ dòng ngô H14 được xác định bởi hãng Macrogen (Hàn Quốc). Kết quả đọc trình tự được so sánh với trình tự trên Genbank sử dụng công cụ Blast nucleotide. Gen *Sh2* từ dòng ngô H14 sau đó được gắn với cấu trúc vector biểu hiện *pCambia1301* cùng với promotor *Ubiquitin (Ubi)* đã được tách dòng và công bố trên Genbank với mã số JX947345.1 để tạo vector chuyển gen mang gen *Sh2*: *pCambia1301-Ubi-Sh2*. Để làm việc này, các enzyme *Bam*HI và *Sac*I được sử dụng để cắt đồng thời vector tách dòng *pBT-Sh2* và vector *pCambia 1301* và gắn gen *Sh2* vào vector *pCambia 1301* bằng T4 DNA ligase để tạo plasmid *pCambia 1301-Sh2* rồi biến nạp vào vi khuẩn *E. Coli* DH5α và nuôi trên môi trường LB đặc có bổ sung kháng sinh chọn lọc kanamycin 50 mg/ ml. Các dòng vi khuẩn được kiểm tra sự có mặt của đoạn gen *Sh2* bằng PCR clony. Cấu trúc *pCambia 1301-Sh2* sau đó được gắn thêm promoter *Ubi* cho việc tạo cấu trúc biểu hiện *pCambia 1301-Ubi-Sh2* bằng việc sử dụng enzyme *Bam*HI và *Pst*I cắt đồng thời cả hai cấu trúc vector *pCambia1301-Sh2* và cấu trúc *pBT-Ubi* và gắn *pCambia 1301-Sh2* với promoter *Ubi* bằng enzyme T4 DNA ligase để tạo vector tái tổ hợp *pCambia 1301- Ubi- Sh2* phục vụ chuyển gen. Cấu trúc này được biến nạp vào vi khuẩn *E. Coli* DH5α. Sau khi kiểm tra sự có mặt bằng PCR clony và cắt kiểm tra bằng enzyme giới hạn *Pst*I và *Bam*HI, cấu trúc *pCambia 1301- Ubi- Sh2* được chuyển vào các dòng vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* EHA105 và C58 bằng phương pháp xung điện để phục vụ cho mục đích chuyển gen.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tách dòng gen *Sh2*

cDNA tổng hợp từ RNA tổng số của dòng ngô H14 được sử dụng để nhân gen *Sh2* bằng PCR với cặp mồi đặc hiệu ZmSh2F và ZmSh2R. Sản phẩm PCR được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 1% (hình 1a) cho thấy, kết quả nhận được là đoạn gen có băng gọn và

rõ nét, kích thước phù hợp với tính toán lý thuyết là 1,5 kb. Như vậy, có thể kết luận bước đầu là gen *Sh2* đã được nhân bản thành công; nhiệt độ bắt mồi và cặp mồi thiết kế là đặc hiệu cho nhân gen *Sh2*. Sau khi gen *Sh2* được gắn vào vector tách dòng *pBT* và biến nạp vào vi khuẩn *E. coli* DH5 α , kết quả điện di sản phẩm clony PCR (hình 1b) cho thấy ở các dòng khuẩn số 2 và 3 cho băng gọn, rõ nét có kích thước tương ứng với đoạn gen mục tiêu 1,5 kb. Kết

quả điện di sản phẩm cắt plasmid sử dụng enzyme *Bam*HI (hình 1c) cũng cho thấy hai dòng khuẩn số 2 và 3 đều cho 2 băng gọn và rõ nét: 1 băng có kích thước khoảng 1,5 kb (tương ứng với kích thước lý thuyết đoạn gen *Sh2*) còn 1 băng có kích thước khoảng 3 kb (tương ứng với vector *pBT*). Do đó, có thể kết luận dòng khuẩn số 2 và 3 mang plasmid chứa đoạn gen có kích thước phù hợp với đoạn gen mong muốn và gen *Sh2* đã được tách dòng thành công.

Hình 1. (a): Điện di kiểm tra sản phẩm PCR với mồi đặc hiệu nhân gen *Sh2*, M: DNA marker 1 kb (Fermentas), 1: gen *Sh2*; (b): Điện di sản phẩm clony PCR với mồi đặc hiệu nhân gen *Sh2*, M: marker DNA 1 kb, 1-7: Các mẫu khuẩn lạc được lựa chọn đánh số thứ tự từ 1 đến 7, +: đối chứng dương (mẫu nhân gen *Sh2* từ cDNA tổng hợp); (c): Kết quả cắt kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2* trong plasmid tái tổ hợp của dòng khuẩn số 2 và 3, M: DNA marker 1 kb, 2.1: sản phẩm cắt kiểm tra plasmid dòng khuẩn số 2, 3.1: sản phẩm cắt kiểm tra plasmid dòng khuẩn số 3.

Kết quả đọc trình tự đoạn gen *Sh2* tách dòng (ký hiệu: *Sh2-TD*) cho thấy đoạn gen *Sh2-TD* có kích thước 1556 bp và có độ tương đồng nucleotide tới 99% so với gen *Sh2* có mã số NM_001127632.1 trên Ngân hàng Gen quốc tế - NCBI (bảng 1).

Gen *Sh2-TD* có một số sai khác ở một số vị trí nucleotide (bảng 2). Tuy nhiên, kết quả so sánh trình tự acid amin suy diễn của gen *Sh2-TD* và *Sh2* (NM_001127632.1) cũng cho mức độ tương đồng tới 99%.

Bảng 1. Kết quả so sánh trình tự gen *Sh2-TD* và gen *Sh2* công bố trên Ngân hàng Gen với mã số NM_001127632.1

	Mã số	Tên gen	Mức độ so sánh	Mức độ tương đồng
	NM_001127632.1	Zea mays Shrunk2 2 (<i>Sh2</i>)	100%	99%
<i>Sh2</i>	1	MQFALALDTNSGPHQIRSCEGDGIDRLEKLSIGGRKQEKALRNRCFGGRVATTTQCILTS		60
		MQFALALDTNSGPHQIRSCEGDGIDRLEKLSIGGRKQEKALRNRCFGGRVATTTQCILTS		
NM	1	MQFALALDTNSGPHQIRSCEGDGIDRLEKLSIGGRKQEKALRNRCFGGRVATTTQCILTS		60
<i>Sh2</i>	61	DACPETLHSQTQSSRKNYADANRVSAIILGGGTGSQLFPLTSTRATPAVVGCCYRLIDI		120
		DACPETLHSQTQSSRKNYADANRVSAIILGGGTGSQLFPLTSTRATPAVVGCCYRLIDI		
NM	61	DACPETLHSQTQSSRKNYADANRVSAIILGGGTGSQLFPLTSTRATPAVVGCCYRLIDI		120
<i>Sh2</i>	121	PMSNCFNSGINKIFVMSQFNSTSLNRHIHRTYLEGGINFADGSVQVLAATQMPEEPAGWF		180
		PMSNCFNSGINKIFVMSQFNSTSLNRHIHRTYLEGGINFADGSVQVLAATQMPEEPAGWF		
NM	121	PMSNCFNSGINKIFVMSQFNSTSLNRHIHRTYLEGGINFADGSVQVLAATQMPEEPAGWF		180

Sh2	181	QGTADSIRKFIWVLEDYYSHKSIDNIVILSGDQLYRMNYMELVQKHVEDDADITISCAPV	240
NM	181	QGTADSIRKFIWVLEDYYSHKSIDNIVILSGDQLYRMNYMELVQKHVEDDADITISCAPV	240
Sh2	241	DESRASKNGLVKIDHTGRVLQFFEKPKGADLNSMRVETNFLSYAIDDAQKYPYLASMGYI	300
NM	241	DESRASKNGLVKIDHTGRVLQFFEKPKGADLNSMRVETNFLSYAIDDAQKYPYLASMGYI	300
Sh2	301	VFKKDALLDLLKSKYTQLHDFGSEILPRAVLDSVQACIFTGYWEDVGTIKSFFDANLAL	360
NM	301	VFKKDALLDLLKSKYTQLHDFGSEILPRAVLDSVQACIFTGYWEDVGTIKSFFDANLAL	360
Sh2	361	TEQPSKFDYDPKTPFFFTAPRCLPPTQLDKCKMKYAFISNGCLLRECNIHESVIGVCSRV	420
NM	361	TEQPSKFDYDPKTPFFFTAPRCLPPTQLDKCKMKYAFISNGCLLRECNIHESVIGVCSRV	420
Sh2	421	SSGCELKDSVMMGADTYETEEASKLLLAGKVPVGIGRNTKIRNCIIDMNARIGKNVIT	480
NM	421	SSGCELKDSVMMGADTYETEEASKLLLAGKVPVGIGRNTKIRNCIIDMNARIGKNVIT	480
Sh2	481	NSKGIQEADHPEEGYYIRSGIVVILKNATINDGSVI	516
NM	481	NSKGIQEADHPEEGYYIRSGIVVILKNATINDGSVI	516

Hình 2. Kết quả so sánh trình tự acid amin suy diễn của gen *Sh2-TD* (*Sh2*) và *Sh2* M_001127632.1 (NM)

Bảng 2. Vị trí sai khác trong trình tự nucleotide của gen *Sh2-TD* và gen *Sh2* mang mã số NM_001127632.1

STT	Vị trí	<i>Sh2-TD</i>	<i>Sh2</i> (NM_001127632.1)
1	156	A	G
2	753	G	A
3	777	C	T
4	987	G	A
5	990	C	T
6	1044	A	T
7	1143	A	C
8	1201	A	G
9	1260	G	T
10	1341	C	A
11	1365	C	T
12	1467	G	T

Bảng 3. Vị trí sai khác trong trình tự acid amin của gen *Sh2 -TD* và gen *Sh2* mang mã số NM_001127632.1

STT	Vị trí thay đổi nucleotide	Nucleotide trên gen <i>Sh2-TD</i>	Nucleotide trên gen <i>Sh2</i> (NM_001127632.1)	Acid amin của gen <i>Sh2-TD</i>	Acid amin của gen <i>Sh2</i> (NM_001127632.1)
1	156	A	G	T (Threonine)	A (Alanine)
2	1201	A	G	N (Asparagine)	D (Aspartate)

Dựa vào kết quả so sánh trình tự acid amin có thể thấy chỉ có hai vị trí thay đổi nucleotide dẫn đến thay đổi acid amin (hình 2, bảng 3).

Từ những kết quả trên có thể khẳng định rằng đã tách dòng thành công gen *Sh2* từ dòng

ngô H14. Trình tự của gen *Sh2-TD* đã được công bố trên Genbank với mã số JX462603.

Thiết kế vector chuyển gen

Sau khi tách dòng, gen *Sh2-TD* được gắn với vector biểu hiện *pCambia1301* cùng với

promoter *Ubi* để tạo vector chuyển gen mang gen *Sh2-TD* (hình 3). Toàn bộ cấu trúc *pCambia 1301-Ubi-Sh2* được chuyển vào vi khuẩn *E. Coli* DH5a và *A. tumefaciens* cho mục đích chuyển gen vào cây ngô.

Kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2-TD* trong các dòng vi khuẩn *E. coli* (hình 4) được biến nạp cấu trúc *pCambia 1301-Ubi-Sh2* bằng PCR colony với mỗi đặc hiệu của gen *Sh2* cho thấy plasmid trong *E. coli* có băng với kích

thước 1,5 kb tương ứng với kích thước gen *Sh2* (hình 4a). Khi cắt kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2-TD* bằng enzyme cắt giới hạn *Bam*HI và *Sac*I (hình 4c) cho thấy ở 3 dòng khuẩn 1, 2 và 3 đều cho 2 băng: 1 băng có kích thước trên 10 kb (tương ứng với kích thước của vector *pCambia 1301*), 1 băng có kích thước khoảng 1,5 kb (tương ứng với kích thước của gen *Sh2*). Như vậy, có thể kết luận các dòng khuẩn này đều mang gen *Sh2-TD*.

Hình 3. Cấu trúc vector chuyển gen *pCambia 1301-Ubi-Sh2*

Hình 4. Kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2-TD* trong plasmid tái tổ hợp *pCambia 1301-Sh2*; (a): Kết quả chọn lọc dòng khuẩn chứa gen *Sh2* bằng PCR colony (M: DNA marker 1 kb (Fermentas); 1-3: các dòng khuẩn từ 1 đến 3); (b): Kết quả tách plasmid các dòng khuẩn chứa gen *Sh2-TD* (M: DNA marker 1 kb; 1-3: plasmid các dòng khuẩn từ 1 đến 3); (c): Kết quả cắt kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2-TD* trong plasmid *pCambia 1301-Ubi-Sh2* (M: DNA marker 1 kb; 1-3: các dòng khuẩn từ 1-3).

Hình 5. Kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Ubi* trong vi khuẩn *E. Coli* DH5a; (a): Kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Ubi* bằng PCR colony với mỗi đặc hiệu nhân gen *Ubi*: (K3 đến K10: các dòng khuẩn số 3 đến số 10; M: DNA marker 1 kb; (b): Kết quả cắt kiểm tra sự có mặt của gen *Ubi* trong plasmid *pCambia 1301-Ubi-Sh2* (M: DNA marker 1 kb; 8, 9, 10: các dòng khuẩn 8, 9 và 10; 11: plasmid nguyên vẹn đối chứng).

Tương tự, kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Ubi* trong các dòng vi khuẩn *E. coli* (hình 4a) được biến nạp cấu trúc *pCambia 1301-Ubi-Sh2* bằng PCR clony với mỗi đặc hiệu của gen *Ubi* cũng cho thấy plasmid trong *E. coli* mang bằng có kích thước giống với kích thước đoạn gen *Ubi* (hình 5a). Sự có mặt của gen *Ubi* còn được kiểm tra bằng cắt plasmid *pCambia 1301-Ubi-Sh2* với enzyme *Pst*I và *Bam*HI ở 3 dòng khuẩn lạc 8, 9 và 10 (hình 5c); kết quả đều cho hai băng có kích thước khoảng 2 kb (tương ứng với kích thước đoạn gen *Ubi*) và trên 10 kb (tương ứng với kích thước của vector *pCambia 1301*). Các kết quả trên hình 4 và hình 5 cho thấy, các dòng khuẩn *E. coli* DH5 α được kiểm tra đều mang plasmid có cả hai gen *Sh2-TD* và *Ubi*.

Kết quả kiểm tra sự có mặt của gen *Sh2-TD* và *Ubi* trong vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* sau khi được biến nạp cấu trúc *pCambia 1301-Ubi-Sh2* bằng sử dụng các enzyme *Bam*HI, *Sac*I và *Pst*I cắt đồng thời (hình 6) cũng cho thấy, plasmid mang vector chuyển gen *pCambia 1301-Ubi-Sh2* trong các chủng vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* EHA105 và C58 đều mang gen *Sh2-TD* và promoter *Ubi*. Trên hình 6 thấy rõ các băng tương ứng với kích thước của *pCambia 1301*, gen *Ubi* và *Sh2* tương ứng là trên 10 kb, 2 kb và 1,5 kb.

Hình 6. Kết quả cắt kiểm tra sự có mặt của gen *Ubi* và *Sh2* trong cấu trúc *pCambia 1301-Ubi-Sh2* được biến nạp vào vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* EHA 105 bằng sử dụng enzyme *Bam*HI, *Sac*I và *Pst*I. (M: DNA marker 1 kb (Fermentas); 8, 9, 10: các dòng khuẩn 8, 9 và 10; 11: plasmid nguyên vẹn đối chứng).

KẾT LUẬN

Từ những kết quả tách dòng gen *Sh2* và thiết kế cấu trúc vector chuyển gen có thể đi đến một số kết luận sau:

Đã tách dòng thành công gen *Sh2* từ dòng ngô H14. Gen *Sh2* phân lập được có mức tương đồng nucleotide với trình tự đã công bố trên Ngân hàng Gen quốc tế lên tới 99%. Trình tự này đã được đăng ký trên Ngân hàng Gen quốc tế với mã số JX462603. Đã thiết kế thành công vector biểu hiện *pCambia 1301-Ubi-Sh2*. Cấu trúc vector chuyển gen hoàn chỉnh *pCambia 1301-Ubi-Sh2* đã được biến nạp thành công vào các chủng vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* EHA105 và C58. Kết quả thu được trong nghiên cứu này góp phần quan trọng trong nghiên cứu chuyển gen tăng cường tổng hợp tinh bột vào các dòng ngô.

Lời cảm ơn: Công trình được thực hiện trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu tạo dòng ngô bổ mẹ được tăng cường khả năng tổng hợp tinh bột bằng công nghệ gen” thuộc Chương trình Trọng điểm phát triển và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bhavé M. R., Lawrence S., Barton C., Hannah L. C., 1990. Identification and molecular characterization of shrunken-2 cDNA clones of maize. *Plant cell*, 2(6): 581-588.
2. Cobb B. G., Hannah L.C., 1998. Shrunken-1 encoded sucrose synthase is not required for sucrose synthesis in the Maize Endosperm1. *Plant Physiol.*, 88: 1219-1221.
3. Denyer K., Dunlap F., Thorbjørnsen T., Keeling P., Smith A. M., 1996. The major form of ADP-Glucose pyrophosphorylase in Maize endosperm 1s extra-plastidial. *Plant Physiol.*, 11 (2): 779-785.
4. Tiessen A., Hendriks J. H., Stitt M., Branscheid A., Gibon Y., Farré E. M., Geigenberger P., 2002. Starch synthesis in potato tubers is regulated by post-translational redox modification of ADP-glucose pyrophosphorylase: a novel regulatory mechanism linking starch

- synthesis to the sucrose supply. *Plant cell*, 14(9): 2191-213.
5. James M. G., Denyer K., Myers A. M., 2003. Starch synthesis in the cereal endosperm. *Plant Biol.*, 6: 215-222.
 6. Li N., Zhang S., Zhao Y., Li B., Zhang J., 2011. Over- expression of AGPase genes enhances seed weight and starch content in transgenic maize. *Planta*, 233: 241-250.
 7. Martinl C., Smith A. M., 1995. Starch Biosynthesis. *The Plant Cell*, 7: 971-985.
 8. Rozen S., Skaletsky H. J., 2000. Primer3 on the WWW for general users and for biologist programmers. In: Krawetz S, Misener S (eds) *Bioinformatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology*. Humana Press, Totowa, NJ, pp 365-386
 9. Sambrook J., Fritsch E. F., Maniatis T., 1989. *Molecular Cloning: A Laboratory Manual* (2nd Edition). Cold Spring Harbor Laboratory, NY.
 10. Shannon J. C., Creech R. G., Loerch J. D., 1970. Starch synthesis studies in *Zea mays*. *Plant Physiol.*, 45: 163-168.

CLONING SHRUNKEN 2 (*Sh2*) GENE FROM H14 MAIZE CULTIVAR AND CONSTRUCTING TRANSFORMATION VECTOR *pCAMBIA 1301-UBI-SH2*

Nguyễn Thị Thu, Lê Hoàng Duc, Nguyễn Đức Thanh

Institute of Biotechnology, VAST

SUMMARY

The Shrunk 2 (*Sh2*) gene encodes the large subunit of endosperm ADP-glucose pyrophosphorylase – one of the enzymes that regulate the starch biosynthetic pathway. This gene had been transferred, successfully, to maize plant. The transgenic maize plants have higher starch content than that of wild type. In this article, we present the results on cloning the *Sh2* gene by PCR from H14 maize cultivar and constructing transformation vector *pCambial301-Ubi-Sh2*. The cloned *Sh2* sequence had high similarity (99%) with sequence of *Sh2* gene in Genbank with accession number NM_001127632.1. The sequence of *Sh2* gene from H14 maize cultivar was submitted to the GenBank with accession number JX462603. The gene was, then, successfully, inserted into expression vector *pCambial301* along with Ubiquitin promoter to construct a transformation vector *pCambial301-Ubi-Sh2*, that will be used for genetic engineering of starch in maize.

Keywords: ADP-glucose pyrophosphorylase, cloning, H14 maize cultivar, Shrunk 2 gene, transformation vector.

Ngày nhận bài: 25-5-2013